

LE PILLOLE DEL LUNEDÌ



NEWSLETTER SULLA CONTRACCEZIONE

N. 8 – 25 GIUGNO 2012

Questa pubblicazione è resa possibile da un
educational grant di Bayer Healthcare



Dall'ambulatorio

Può la diarrea
interferire con la
sicurezza
anticoncezionale
della pillola?

Dal mondo della contraccezione

Estradiolo
valerato-dienogest
non altera i
parametri
metabolici ed
emostatici

Voci di donna

ISS: ancora bassa
la copertura
vaccinale del
papilloma virus



Gentile dottoressa/dottore,

Le "Pillole del Lunedì" è un'iniziativa editoriale che ha l'obiettivo di fornire ai medici di medicina generale un'informazione pratica e aggiornata sui temi della contraccezione e della salute della donna.

Le ricordiamo che nel portale Scegli Tu è attiva un'intera sezione dedicata al MMG dove potrà trovare tante informazioni e notizie utili per la pratica quotidiana.

buona lettura!

Editore: Intermedia per la Comunicazione Integrata

Via Malta, 12/b – 25124 Brescia

Direttore Responsabile: Mauro Boldrini

Direttore Scientifico: Emilio Arisi

Clicca [qui](#) se non desideri più ricevere questa newsletter



Dall'ambulatorio

Può la diarrea interferire con la sicurezza anticoncezionale della pillola?

La pillola viene assorbita dall'organismo a livello intestinale. Quindi se l'attacco di diarrea avviene entro le 6/8 ore dopo l'assunzione del farmaco (tempo tecnico in cui la pillola passa dalla bocca all'intestino dopo la sua permanenza nello stomaco) la sua sicurezza anticoncezionale può essere compromessa. In questo caso è necessario assumere un ulteriore contraccettivo orale scalando dalle pillole della stessa confezione. Così facendo l'assunzione del farmaco terminerà un giorno prima. Oppure, per evitare confusione, è consigliabile per una donna avere una confezione di riserva del farmaco dalla quale pescare un'eventuale pillola sostitutiva. Se la diarrea persiste per giorni e' opportuno consigliare una precauzione aggiuntiva, per esempio con un preservativo.

Il prof. Emilio Arisi risponde on line alle domande dei colleghi.



Prof. Emilio Arisi

Dal mondo della contraccezione

Estradiolo valerato-dienogest non altera i parametri metabolici ed emostatici

Uno studio condotto da ricercatori tedeschi ha comparato gli effetti emostatici e metabolici di un contraccettivo orale combinato (COC) contenente estradiolo valerato e dienogest (E2V/DNG) con la combinazione etinilestradiolo-levonorgestrel (EE/LNG), in sette cicli di utilizzo. Nelle partecipanti il peso corporeo e la pressione arteriosa sono rimasti stabili durante tutto lo studio con entrambi i regimi. Le due formulazioni sono state ben tollerate e nessun evento avverso serio è stato riportato. In conclusione, il regime E2V/DNG ha mostrato un impatto minimo sui parametri metabolici ed emostatici e un più favorevole effetto sui marcatori lipidici rispetto a EE/LNG.

Metabolic and haemostatic effects of estradiol valerate/dienogest, a novel oral contraceptive: a randomized, open-label, single-centre study. Clinical Drug Investigation 2011

Voci di donna

ISS: ancora bassa la copertura vaccinale del papilloma virus

A 4 anni dall'avvio del programma di immunizzazione, non decolla il vaccino contro l' HPV. Secondo i dati del Reparto di epidemiologia di malattie infettive del Cnesps-Iss i valori medi sono progressivamente calati, passando da una media del 65% di dodicenni nate nel '97 vaccinate con 3 dosi, al 62,4% per la coorte del '98 e al 51,7% per quelle del '99. I dati mostrano che al fine 2011 la copertura per tre dosi di vaccino del 70% è stata raggiunta per la coorte di nascita 1997 da otto regioni, e da sette la coorte del 1998. Le regioni che hanno fatto registrare i risultati migliori sono state Basilicata, Puglia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, mentre, Campania, Sicilia, Sardegna e Lazio hanno avuto i valori minori. Solo sette regioni hanno esteso l'offerta gratuita della vaccinazione ad altre fasce di età.

Per scaricare l'intero abstract vai su www.sceglitu.it area riservata MMG